

Tabel 5. Krooniliste haigete jälgimine:

| Indikaatori nimi ja nr | Kood | Selgitus | Hõlmatus | Punkte | Kommentaar |
|---|------------------------|--|----------|--------|---|
| 2. Diabeet 1 | Loetelu | Loetelu II tüüpi diabeedi (E11) haigetest esitatud | Jah | 10 | Esitatakse haigekassale jooksva kalendriaasta 1. jaanuari seisuga |
| 2. Diabeet 2 | 66118 | Diabeet II haigetel määratud glükoheemoglobiin | 71% | 15 | 1x aastas |
| 2. Diabeet 3 | 66102 | Diabeet II haigetel määratud kreatiniin vereseerumis | 72% | 15 | |
| 2. Diabeet 4 | 66104 | Diabeet II haigetel määratud üldkolesterool | 75% | 15 | |
| 2. Diabeet 5 | 66105 | Diabeet II haigetel määratud kolesterooli fraktsioonid 1 kord 3 aasta jooksul | 80% | 15 | 1x 3 aasta jooksul |
| 2. Diabeet 6 | 66117 või 66207 | Määratud albumiin uriinis (mikroalbuminuuria) või mikroalbuminuuria-positiivsetel haigetel tehtud uriini analüüs | 64% | 15 | 1x aastas |
| 2. Diabeet 7 | 9015 | Pereõe nõustamine | 50% | 15 | |
| I (madal risk): Hüpertoonia 1 | Loetelu | Hüpertooniatõvehaigete (I10-I15 ja jagunemine astmeteks) loetelu olemas | Jah | 10 | Esitatakse haigekassale jooksva kalendriaasta 1. jaanuari seisuga |
| Hüpertoonia 2 (indikaatori sihtgrupist on välistatud diabeedihaiged: E10 EHK andmebaasis sama aasta eriarsti ja perearsti arvetel, E11 perearsti poolt esitatud loetelu alusel) | 66101 | Glükoos 1 kord 3 aasta jooksul | 80% | 15 | 1x 3 aasta jooksul |
| Hüpertoonia 3 | 66104 | Üldkolesterool 1 kord 3 aasta jooksul | 80% | 15 | |
| Hüpertoonia 4 | 6320 või 6322 või 6323 | EKG 1 kord 3 aasta jooksul | 80% | 15 | |
| Hüpertoonia 5 | 9015 | Pereõe nõustamine | 50% | 15 | 1x aastas |
| II (mõõdukas lisarisk): Hüpertoonia 6 | 66104 | Üldkolesterool | 66% | 15 | |
| Hüpertoonia 7 | 66105 | Kolesterooli fraktsioonid | 57% | 15 | |
| Hüpertoonia 8 (indikaatori sihtgrupist on välistatud diabeedihaiged: E10 EHK andmebaasis sama aasta eriarsti ja perearsti arvetel, E11 perearsti poolt esitatud loetelu alusel) | 66101 | Glükoos | 68% | 15 | 1x 3 aasta jooksul |
| Hüpertoonia 9 | 66102 | Kreatiniin | 61% | 15 | |
| Hüpertoonia 10 | 6320 või 6322 või 6323 | EKG 1 kord 3 aasta jooksul | 80% | 15 | 1x 3 aasta jooksul |

| | | | | | |
|---|--------------------|---|-----|------------|--|
| Hüpertoonia 11 | 66117 või 66207 | Määratud albumiin uriinis (mikroalbuminuuria) või mikroalbuminuuria-positiivsetel haigetel tehtud uriini analüüs | 54% | 15 | 1x aastas |
| III (kõrge ja ülikõrge lisarisk): | | | | | |
| Hüpertoonia 12 | 66104 | Üldkolesterool | 69% | 15 | |
| Hüpertoonia 13 | 66105 | Kolesterooli fraktsioonid | 60% | 15 | |
| Hüpertoonia 14 (indikaatori sihtgrupist on välistatud diabeedihai­ged: E10 EHK andmebaasis sama aasta eriarsti ja perearsti arvetel, E11 perearsti poolt esitatud loetelu alusel) | 66101 | Glükoos | 72% | 15 | |
| Hüpertoonia 15 | 66102 | Kreatiniin | 65% | 15 | |
| Hüpertoonia 16 | 66117 või 66207 | Määratud albumiin uriinis (mikroalbuminuuria) või mikroalbuminuuria-positiivsetel haigetel tehtud uriini analüüs | 55% | 15 | |
| Infarkt 1 | Loetelu | Müokardi infarkti (I21, I22, I23, I25.2) läbiteinute loetelu olemas | Jah | 10 | Esitatakse haigekassale jooksva kalendriaasta 1. jaanuari seisuga |
| Infarkt 2 | 66104 | Üldkolesterool | 30% | 15 | 1x aastas |
| Infarkt 3 (indikaatori sihtgrupist on välistatud diabeedihai­ged: E10 EHK andmebaasis sama aasta eriarsti ja perearsti arvetel, E11 perearsti poolt esitatud loetelu alusel) | 66101 | Glükoos | 30% | 15 | 1x aastas |
| Hüpotüreosis 1 | Loetelu | Hüpotüreosisi (E01, E02, E03, E89.0) diagnoosiga haigete loetelu olemas | Jah | 10 | Esitatakse haigekassale jooksva kalendriaasta 1. jaanuari seisuga |
| Hüpotüreosis 2 | 66706 | TSH | 30% | 15 | 1x aastas |
| Punkte: | | | | 400 | |