

**2010. a lisatasu taotlenud arstide vastava tegevusega saavutatud tulemuste keskmised protsendid**

osales 718 nimistut

<b>SVH ennetuse riskigrupi isikud:</b>	indikaator	isikuid	hõlmatus 2010
40-60aastastel riskigrupi kuuluvatel isikutel määratud glükoos	SVH2	sihtrühmas isikuid	638
		hõlmatud isikuid	429
40-60aastastel riskigrupi kuuluvatel isikutel määratud kolesterooli fraktsioonid	SVH3	sihtrühmas isikuid	636
		hõlmatud isikuid	388
Pereõe nõustamine 40-60aastastel riskigrupi kuuluvatel isikutel	SVH4	sihtrühmas isikuid	636
		hõlmatud isikuid	436

<b>II tüüpi diabeedi haiged:</b>	indikaator	isikuid	hõlmatus 2010
Diabeet II haiged, kellel määratud glükohemoglobiin	DIAB2	sihtrühmas isikuid	47 689
		hõlmatud isikuid	31 667
Diabeet II haigetel määratud kreatiniin vereseerumis	DIAB3	sihtrühmas isikuid	47 741
		hõlmatud isikuid	31 736
Diabeet II haigetel määratud üldkolesterool	DIAB4	sihtrühmas isikuid	47 706
		hõlmatud isikuid	32 995
Diabeet II haigetel määratud kolesterooli fraktsioonid üks kord kolme aasta jooksul	DIAB5	sihtrühmas isikuid	48 761
		hõlmatud isikuid	42 280
Diabeet II haigetel määratud albumiin uriinis (mikroalbuminuuria) või mikroalbuminuuria-positiivsetel haigetel tehtud uriini analüüs	DIAB6	sihtrühmas isikuid	39 963
		hõlmatud isikuid	16 938
Pereõe nõustamine	DIAB7	sihtrühmas isikuid	47 817
		hõlmatud isikuid	30 672

<b>Hüpertooniatõve haiged:</b>	indikaator	isikuid	hõlmatus 2010
Madala riskiga haigetel: Glükoos üks kord kolme aasta jooksul	HYP1-2	sihtrühmas isikuid	98 977
		hõlmatud isikuid	78 183
Üldkolesterool üks kord kolme aasta jooksul	HYP1-3	sihtrühmas isikuid	109 586
		hõlmatud isikuid	88 520
EKG üks kord kolme aasta jooksul	HYP1-4	sihtrühmas isikuid	109 519
		hõlmatud isikuid	78 254
Pereõe nõustamine	HYP1-5	sihtrühmas isikuid	107 489
		hõlmatud isikuid	52 839
Keskmise lisariskiga haigetel: Üldkolesterool	HYP2-6	sihtrühmas isikuid	127 372
		hõlmatud isikuid	77 168
Kolesterooli fraktsioonid	HYP2-7	sihtrühmas isikuid	127 120
		hõlmatud isikuid	68 111
Glükoos	HYP2-8	sihtrühmas isikuid	105 542
		hõlmatud isikuid	62 297
Kreatiniin	HYP2-9	sihtrühmas isikuid	127 428
		hõlmatud isikuid	72 611
EKG üks kord kolme aasta jooksul	HYP2-10	sihtrühmas isikuid	129 565
		hõlmatud isikuid	100 574
Määratud albumiin uriinis (mikroalbuminuuria) või mikroalbuminuuria-positiivsetel haigetel tehtud uriini analüüs testribaga	HYP2-11	sihtrühmas isikuid	118 719
		hõlmatud isikuid	38 117
Kõrge või ülikõrge lisariskiga haigetel: Üldkolesterool	HYP3-12	sihtrühmas isikuid	26 141
		hõlmatud isikuid	17 503
Kolesterooli fraktsioonid	HYP3-13	sihtrühmas isikuid	26 090
		hõlmatud isikuid	15 815
Glükoos	HYP3-14	sihtrühmas isikuid	17 426
		hõlmatud isikuid	11 284
Kreatiniin	HYP3-15	sihtrühmas isikuid	26 177
		hõlmatud isikuid	16 890
Määratud albumiin uriinis (mikroalbuminuuria) või mikroalbuminuuria-positiivsetel haigetel tehtud uriini analüüs testribaga	HYP3-16	sihtrühmas isikuid	21 264
		hõlmatud isikuid	7 946

<b>Infarkti läbi teinud haiged:</b>	indikaator	isikuid	hõlmatus 2010
Määratud üldkolesterool	INF2	sihtrühmas isikuid	14 053
		hõlmatud isikuid	9 763
Määratud glükoos	INF3	sihtrühmas isikuid	10 921
		hõlmatud isikuid	7 450

<b>Hüpotüreooosi haiged:</b>	indikaator	isikuid	hõlmatus 2010
Määratud TSH	E03-2	sihtrühmas isikuid	27 450
		hõlmatud isikuid	17 441