

**2008. aastal lisatasu taotlenud arstide vastava tegevusega saavutatud  
tulemuste keskmised hõlmatused**

**II -tüüpi diabeet**

Loetelu II tüüpi diabeedi (E11) haigetest esitatud	loetelu esitanud nimistuid	636
	sh nimistuid koef-ga 1,5*	48
Diabeet II haigetel määratud glükohemoglobiin; 66118	isikuid	27 351
	hõlmatuid	16 710
2008.a. nõutav hõlmatus 56%	<b>hõlmatus</b>	<b>61%</b>
Diabeet II haigetel määratud kreatiniin vereseerumis; 66102	isikuid	27 364
	hõlmatuid	16 926
2008.a. nõutav hõlmatus 59%	<b>hõlmatus</b>	<b>62%</b>
Diabeet II haigetel määratud üldkolesterool; 66104	isikuid	27 336
	hõlmatuid	17 878
2008.a. nõutav hõlmatus 65%	<b>hõlmatus</b>	<b>65%</b>
Diabeet II haigetel määratud kolesterooli fraktsioonid 1 kord 3 aasta jooksul; 66105 (6503f)	isikuid	27 505
	hõlmatuid	19 632
2008.a. nõutav hõlmatus 80%	<b>hõlmatus</b>	<b>71%</b>
Määratud albumiin uriinis (mikroalbuminuuria) või mikroalbuminuuria-positiivsetel haigetel tehtud uriini analüüs; 66117 või 66207	isikuid	27 291
	hõlmatuid	14 822
2008.a. nõutav hõlmatus 46%	<b>hõlmatus</b>	<b>54%</b>
Pereõe nõustamine; 9015	isikuid	27 329
	hõlmatuid	14 448
2008.a. nõutav hõlmatus 50%	<b>hõlmatus</b>	<b>53%</b>

**Hüpertooniatõbi**

Loetelu hüpertooniatõve (I10-I15) haigetest esitatud	loetelu esitanud nimistuid	642
	sh nimistuid koef-ga 1,5*	41
<b>1.astme hüpertooniatõvehaiged</b>	loetelu esitanud nimistuid	632
	sh nimistuid koef-ga 1,5*	90
Glükoos 1 kord 3 aasta jooksul; 66101 (6500b)	isikuid	53 417
	hõlmatuid	42 528
2008.a. nõutav hõlmatus 80%	<b>hõlmatus</b>	<b>80%</b>
Üldkolesterool 1 kord 3 aasta jooksul; 66104 (6501f)	isikuid	53 334
	hõlmatuid	42 135
2008.a. nõutav hõlmatus 80%	<b>hõlmatus</b>	<b>79%</b>
EKG 1 kord 3 aasta jooksul; 6320 või 6322 või 6323	isikuid	53 238
	hõlmatuid	36 313
2008.a. nõutav hõlmatus 80%	<b>hõlmatus</b>	<b>68%</b>
Pereõe nõustamine; 9015	isikuid	52 816
	hõlmatuid	24 790
2008.a. nõutav hõlmatus 50%	<b>hõlmatus</b>	<b>47%</b>
<b>2.astme hüpertooniatõvehaiged</b>	loetelu esitanud nimistuid	633
	sh nimistuid koef-ga 1,5*	81
Üldkolesterool ; 66104	isikuid	101 407
	hõlmatuid	56 896
2008.a. nõutav hõlmatus 59%	<b>hõlmatus</b>	<b>56%</b>
Kolesterooli fraktsioonid ; 66105	isikuid	101 251
	hõlmatuid	47 451
2008.a. nõutav hõlmatus 48%	<b>hõlmatus</b>	<b>47%</b>
Glükoos ; 66101	isikuid	101 596
	hõlmatuid	58 800
2008.a. nõutav hõlmatus 62%	<b>hõlmatus</b>	<b>58%</b>
Kreatiniin; 66102	isikuid	101 442
	hõlmatuid	51 743
2008.a. nõutav hõlmatus 52%	<b>hõlmatus</b>	<b>51%</b>
EKG 1 kord 3 aasta jooksul; 6320 või 6322 või 6323	isikuid	102 325
	hõlmatuid	70 659
2008.a. nõutav hõlmatus 80%	<b>hõlmatus</b>	<b>69%</b>
Määratud albumiin uriinis (mikroalbuminuuria) või mikroalbuminuuria-positiivsetel haigetel tehtud uriini analüüs; 66117 või 66207	isikuid	101 291
	hõlmatuid	44 221
2008.a. nõutav hõlmatus 48%	<b>hõlmatus</b>	<b>44%</b>

<b>3.astme hüpertooniatõvehaiged</b>	loetelu esitanud nimistuid	558
	sh nimistuid koef-ga 1,5*	89
Üldkolesterool ; 66104	isikuid	9 859
	hõlmatuid	5 768
2008.a. nõutav hõlmatus 60%	<b>hõlmatus</b>	<b>59%</b>
Kolesterooli fraktsioonid ; 66105	isikuid	9 828
	hõlmatuid	4 892
2008.a. nõutav hõlmatus 52%	<b>hõlmatus</b>	<b>50%</b>
Glükoos ; 66101	isikuid	9 907
	hõlmatuid	6 112
2008.a. nõutav hõlmatus 67%	<b>hõlmatus</b>	<b>62%</b>
Kreatiniin; 66102	isikuid	9 865
	hõlmatuid	5 408
2008.a. nõutav hõlmatus 56%	<b>hõlmatus</b>	<b>55%</b>
EKG; 6320 või 6322 või 6323	isikuid	9 827
	hõlmatuid	4 652
2008.a. nõutav hõlmatus 52%	<b>hõlmatus</b>	<b>47%</b>
Määratud albumiin uriinis (mikroalbuminuuria) või mikroalbuminuuria-positiivsetel haigetel tehtud uriini analüüs; 66117 või 66207	isikuid	9 834
	hõlmatuid	4 473
2008.a. nõutav hõlmatus 42%	<b>hõlmatus</b>	<b>45%</b>

### **Infarkt**

Müokardi infarkti (I21, I22, I23, I25.2) läbiteinute loetelu olemas	loetelu esitanud nimistuid	575
	sh nimistuid koef-ga 1,5*	79
	isikuid	7 786

### **Hüpotüreosis**

Hüpotüreosisi (E03) diagnoosiga haigete loetelu olemas	loetelu esitanud nimistuid	620
	sh nimistuid koef-ga 1,5*	72
	isikuid	11 810

\*perearstile, kelle nimistus on vastava kroonilise haigusega patsiente 2x enam kui Eesti keskmine, arvestatakse nimetatud kroonilise haiguse osa punktid koefitsiendiga 1,5, kuid mitte üle nimetatud tervishoiuteenuse piirhinna