

Indikaatori nimetus	Neuroloogia indikaator 7: Osakaal ajuinfarkti ja kodade virvendusarütmiaga patsientidest, kellele on määratud püsiv suukaudne antikoagulantravi 12 kuud + 1 päev hiljem alates akuutsest ajuinfarktist.
Indikaatori kirjeldus/vajaduse põhjendus	Suukaudne antikoagulantravi on näidustatud patsientidele, kellel on ajuinfarkt ja mittevalvulaarne kodade virvendusarütmit (paroksüsmaalne või permanentne). Oluline on, et patsient jääks vastunäidustuste puudumisel püsivalt suukaudsele antikoagulantravile. Hindamine 12 kuud pärast haigestumist kasutades Retseptikeskuse andmeid. Kõikidele patsientidele ei ole antikoagulantravi näidustatud, kuid riiklikul tasemel ja maakondade kaupa on võimalik monitoorida trende.
Definitsioon	Insulti haigestunud ja kodade virvendusarütmiaga patsientide osakaal (%), kellele on määratud püsivalt 12 kuu vältel pärast insulti haigestumist/pärast akuutravi suukaudne antikoagulantravi.
Indikaatori tüüp	Protsessi indikaator.
Lugeja	V- Insuldi (RHK I63.0-I63.9) ja kodade virvendusarütmiaga (RHK I48) patsientide osakaal, kellele on peale akuutravi välja kirjutatud suukaudne antikoagulant ravi (Retsept on aktiivne 12 kuud + 1 päev)
Nimetaja	U- Kõik patsiendid, kellel on põhidiagnoosina ajuinfarkt ja kaasuvdiagnoosina mittevalvulaarne kodade virvendusarütmit. P – Kõik insulti haigestunud patsiendid, kes on surnud 14 päeva jooksul peale hospitaliseerimist (RHK I63)
Valem:	$X = (V/U - P) * 100$
Sihtgrupp:	Kõik patsiendid, kellel on põhidiagnoosina ajuinfarkt ja kaasuvdiagnoosina mittevalvulaarne kodade virvendusarütmit, kellele on määratud kestab suukaudne antikoagulantravi.
Eeldused indikaatori arvutamiseks:	Patsiendid, kellel on <ul style="list-style-type: none"> • Põhidiagnoos I63.0-I63.9 • Kaasuv diagnoos I48 mittevalvulaarne kodade virvendusarütmit (paroksüsmaalne või permanentne). • Hospitaliseerimise kuupäev • Antikoagulantravi retsepti kirjutamise kuupäev • Erakorralise abi tunnus • Statsionaarse ravi tunnus Retseptikeskusest kogutavad andmed: <ul style="list-style-type: none"> • Toimeained: dabigatraan, rivaroksabaan, apiksabaan või varfariin (ATC koodid)

Sisse arvatud	<ul style="list-style-type: none"> • 12 kuud + 1 päev hiljem peale hospitaliseerimist on patsiendil olemas Retseptikeskuses aktiivne antikoagulantravi retsept. • Patsiendid alates 19.ndast eluaastast.
Välja arvatud	<ul style="list-style-type: none"> • RHK I61.0-I61.9 • Ambulatoorne raviarve • Hooldusravil/ statsionaarsel õendusravil olevad patsiendid • Taastusravil olevad patsiendid • Välja arvatud patsiendid, kes on surnud 14 päeva jooksul peale hospitaliseerimist.
Tõlgendus	Eesmärk: 75%
Andmeallikad	Retseptikeskus
Jälgimisperiood	Jälgimisperiood 01. jaanuar- 31. detsember
Edasine informatsioon	<p>1. European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee; ESO Writing Committee.Guidelines for Management of Ischaemic Stroke and Transient Ischaemic Attack 2008. Cerebrovasc Dis. 2008;25:457-507.</p> <p>2. Jauch EC, Saver JL, Adams HP Jr, et al; .Guidelines for the early management of patients with acute ischemic stroke: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2013;44:870-947.</p> <p>3. http://www.kcks-vest.dk/forside</p> <p>4. Quality and Efficiency in Swedish Health Care. Regional Comparisons 2012. Swedish Association of Local Authorities and Regions. Swedish National Board of Health and Welfare 2013.</p> <p>5. Stroke Unit Trialists' Collaboration: Organised inpatient (stroke unit) care for stroke; in: Cochrane Library, Issue 2, 2013;9:CD000197. doi: 10.1002/14651858.CD000197.</p>

Indikaator 7 rakendusjuhend:	Osakaal ajuinfarkti ja kodade virvendusarütmiaga patsientidest, kellele on määratud püsiv suukaudne antikoagulantravi 12 kuud + 1 päev hiljem alates akuutsest ajuinfarktist.
Võrreldav rahvuslik dimensioon	<p>Ühtset rahvusvahelist võrdlust ei ole. Indikaator on välja töötatud ja kokku lepitud eriala ekspertide poolt.</p> <p>Taani ravikvaliteedi indikaatorite hulgast on leitud mõõdik, mis jälgib näidustatud suukaudse antikoagulantravi välja kirjutamist 14 päeva jooksul peale haigestumist.</p>
Eesmärk	Indikaatori eesmärk on mõõta patsientide osakaalu, kellele on näidustatud ravi olemas 12 kuud +1 päev peale hospitaliseerimist. Indikaatori hinnatav tulemus väljendub kehtiva (aktiivse) antikoagulantravi retsepti olemasolus 12 kuu + 1 päeval.

	<p>Indikaator on kujundatud mõõtma trende.</p> <p>Ravistandarditele tuginev näidustatud ravi määramise eesmärk on 75% kogu haigestunud patsientidest.</p> <p>Patsiendid, kellele on ravi vastu näidustatud või patsiendid, kes on surnud 14 päeva jooksul peale hospitaliseerimist, on arvestatud 25 % sisse.</p>
Arvestus	<ul style="list-style-type: none"> • Arvestuse alguseks on hospitaliseerimise kuupäev. • Valemissse kuuluvad patsiendid, kellel on põhidiagnoosina RHK I63.0-I63.9 ja kaasuvdiagnoosina RHK I48. • Patsientide üldarvu (V) sisse arvatakse patsiendid, kellel on 12 kuu + 1 päeva jooksul põhjendatult ravi katkestatud (nt plaanilised operatsioonid) eeldusel, et vastunäidustuste puudumisel määratakse ravim uuesti. • Indikaator ei mõõda patsiendi raviskeemi järgimist, st määratud ravi tegelikku manustamist. • 12 kuu arvestuseks on vastavalt kalenderaasta päevade hulk + 1 päev alates hospitaliseerimise kuupäevast.
Andmete edastamiseks vajalikud lahendused	<ul style="list-style-type: none"> • Andmed on kättesaadavad Retseptikeskusest vastavalt toimeainele (ATC koodid).