

2013. a perearstide vastava tegevusega saavutatud tulemuste keskmised protsendid

SVH ennetuse riskigrupi isikud	indikaator		isikuid	hõlmatus 2013
40-60aastastel riskigruppi kuuluvatel isikutel määratud	SVH1	sihtrühmas isikuid	225 907	65%
		hõlmatud isikuid	147 937	

II tüüpi diabeedi haiged:	indikaator		isikuid	hõlmatus 2013
Diabeet II haiged, kellel määratud glükoheemoglobiin	DIAB2	sihtrühmas isikuid	60 947	75%
		hõlmatud isikuid	45 743	
Diabeet II haigetel määratud kreatiniin vereseerumis	DIAB3	sihtrühmas isikuid	61 077	76%
		hõlmatud isikuid	46 705	
Diabeet II haigetel määratud üldkolesterool	DIAB4	sihtrühmas isikuid	60 960	76%
		hõlmatud isikuid	46 566	
Diabeet II haigetel määratud kolesterooli fraktsioonid üks	DIAB5	sihtrühmas isikuid	62 146	88%
		hõlmatud isikuid	54 908	
Diabeet II haigetel määratud albumiin uriinis	DIAB6	sihtrühmas isikuid	46 913	51%
		hõlmatud isikuid	23 945	
Pereõe nõustamine	DIAB7	sihtrühmas isikuid	60 882	68%
		hõlmatud isikuid	41 411	

Hüpertooniatõve haiged:	indikaator		isikuid	hõlmatus 2013
Madala riskiga haigetel: Glükoos üks kord kolme aasta	HYP1-2	sihtrühmas isikuid	76 508	86%
		hõlmatud isikuid	65 694	
Üldkolesterool üks kord kolme aasta jooksul	HYP1-3	sihtrühmas isikuid	83 078	86%
		hõlmatud isikuid	71 800	
Pereõe nõustamine	HYP1-5	sihtrühmas isikuid	81 591	62%
		hõlmatud isikuid	50 848	
Keskmise lisariskiga haigetel: Üldkolesterool	HYP2-6	sihtrühmas isikuid	172 643	69%
		hõlmatud isikuid	119 038	
Kolesterooli fraktsioonid	HYP2-7	sihtrühmas isikuid	172 480	65%
		hõlmatud isikuid	111 608	
Glükoos	HYP2-8	sihtrühmas isikuid	141 865	67%
		hõlmatud isikuid	95 512	
Kreatiniin	HYP2-9	sihtrühmas isikuid	172 875	68%
		hõlmatud isikuid	118 004	
EKG üks kord kolme aasta jooksul	HYP2-10	sihtrühmas isikuid	174 759	75%
		hõlmatud isikuid	131 049	
Määratud albumiin uriinis (mikroalbuminuuria) või	HYP2-11	sihtrühmas isikuid	154 908	42%
		hõlmatud isikuid	65 186	
Pereõe nõustav vastuvõtt	HYP2-17	sihtrühmas isikuid	172 486	57%
		hõlmatud isikuid	97 934	
Kõrge või ülikõrge lisariskiga haigetel: Üldkolesterool	HYP3-12	sihtrühmas isikuid	45 178	73%
		hõlmatud isikuid	32 936	
Kolesterooli fraktsioonid	HYP3-13	sihtrühmas isikuid	45 101	68%
		hõlmatud isikuid	30 809	
Glükoos	HYP3-14	sihtrühmas isikuid	29 382	71%
		hõlmatud isikuid	20 780	
Kreatiniin	HYP3-15	sihtrühmas isikuid	45 306	73%
		hõlmatud isikuid	33 071	
Määratud albumiin uriinis (mikroalbuminuuria) või	HYP3-16	sihtrühmas isikuid	34 736	45%
		hõlmatud isikuid	15 664	
Pereõe nõustav vastuvõtt	HYP3-18	sihtrühmas isikuid	45 107	62%
		hõlmatud isikuid	28 186	
Kõigi riskiastmetega hüpertooniatõvehaigetele	HYP3-19	sihtrühmas isikuid	45 107	62%
		hõlmatud isikuid	28 186	
Kõigi riskiastmetega mikroalbuminuuria	HYP3-20	sihtrühmas isikuid	37 251	65%
		hõlmatud isikuid	24 101	

<u>Infarkti läbi teinud haiged:</u>	indikaator	isikuid	hõlmatus 2013
Määratud üldkolesterool	INF2	sihtrühmas isikuid	18 861
		hõlmatud isikuid	14 797
Määratud glükoos	INF3	sihtrühmas isikuid	14 259
		hõlmatud isikuid	11 015
			78%
			77%

<u>Hüpotüreooosi haiged:</u>	indikaator	isikuid	hõlmatus 2013
Määratud TSH	E03-2	sihtrühmas isikuid	37 031
		hõlmatud isikuid	29 073
			79%