

Taotluse 776 „Fraktsioneeritud voolureserv“ menetlemiseks palume järgmisi andmeid:

1. Täpsustada protseduuri vajavate patsientide hulk ja diagnostilised valikukriteeriumid (milline koronaaride patoloogia, millistel tingimustel).

FFR kasutatakse angioplastika vajaduse määramiseks ja angioplastika tulemuse hindamiseks. Kasutussagedus on sarnane endovaskulaarse piltdiagnostika sagedusele. Erinevad keskused kasutavad seda erinevalt. Tõenäoline optimaalne vahemik võiks olla 5-10% angioplastikatest. Samuti võib olla, et FFR tulemusena ei ole interventsioon vajalik. Hindan eesti vajaduseks 150-(300) juhtu aastas. FFR võiks olla tõenäoliselt veidi vähem kasutatud kui endovaskulaarne piltdiagnostika, kuid erinevate keskuste kasutussagedused on erinevad.

2. Selgitada, kuidas on paktikas omavahel seotud fraktsioneeritud voolureservi ja angiograafia (koronarograafia) teenuste kasutus? Kas fraktsioneeritud voolureservi (ruumi vahetamata) uuringuga koos tehakse alati koronarograafia?

Jah. FFR järgneb alati angiograafiale, kuna FFR mõte ongi ju teha kindlaks angioplastika vajadus juhul, kui stenoosi hemodünaamiline olulisus jääb visuaalse hindamisega ebaselgeks.

3. Esitada uuendatud kuluandmed ning teenuse spetsiifiliste tarvikute (juhtekateeter, rõhutraat) ostuarvete koopiad.

Seltsil puuduvad kuluandmed. Soovitan küsida kuluandmeid näiteks PERHist, TÜKist või ITKHst. Neis keskustes on FFR olemas ja kasutusel. Kasutust piirab hetkel kompensatsiooni puudumine.