

Hü�oglukeemiaga patsiendi suunamine endokrinoloogi vastuvõtule

Sissejuhatus. Käesolevas uuringus vaadeldud patsientidel hüpoglukeemia diagnoosiga seotud endokrinoloogi konsultatsioone ei olnud.

Tulemuste interpretatsioon. Hüpoglukeemiat esineb alla 1%-l opereeritustest ja see on bariatrilise kirurgia, sagedamini maost möödajuhtiva operatsiooni, hilistüüpi. Tegemist on söögijärgse hüpoglukeemiaga, mis ilmneb 1–3 aastat pärast operatsiooni ja esineb nii diabeediga kui ka diabeeti mittepõdevatel haigetel ega ole seotud diabeedi raviga. Valdav osa hüpoglukeemia vorme on kerged ja ennetatavad toitumissoovitustega, mida annavad toitumisterapeudid või bariatria õed. Endokrinoloogi konsultatsiooni vajavadki väga vähesed patsiendid. Selle indikaatori rakendamist teistes riikides hinnata ei saa.

Limitatsioonid. Võimalik, et hüpoglukeemiaga seotud endokrinoloogi visiitidel kasutati teisi diagnoosikoode ning need patsiendid jäid valimist välja.

Kokkuvõte. Soovituse mitterakendamine kajastab vähest vajadust endokrinoloogi konsultatsiooni järele hüpoglukeemia näidustusel.

Ilmar Kaur, Põhja-Eesti Regionaalhaigla üldkirurg-ülemarst, Kaalukirurgia Keskuse ülemarst