

## **Luutiheduse uuring bariaatrilise operatsiooni järgselt**

**Sissejuhtus.** Ravijuhend soovib kaks aastat peale operatsiooni kaaluda luutiheduse uuringu tegemist tuvastamiseks patsiente, kel on kalduvus luutiheduse languseks peale operatsiooni. Kaudselt peegeldavad luukadu ka PTH (parathormoon), vit D3 ja ioniseeritud kaltsiumi tase vereseerumis, millest informatiivseimaks peetakse PTH-d. Rutiinse densitomeetrilise uuringu soovitus teiste riikide ravijuhistes ei ole.

**Tulemuste interpretatsioon.** Käesoleva andmekogu põhjal on erinevates haiglates opereeritud patsientidest luutiheduse uuringu saanute kumulatiivne osakaal 0-6%.

**Limitatsioonid.** Jääb ebaselgeks, kas uuring tehti eelneva bariaatrilise operatsiooni tõttu või muul näidustusel.

**Kokkuvõte.** Soovitus praktiliselt ei täideta. Kuna näidustus rutiinseks luutiheduse uuringuks on küsitav, siis ei pea ma pingutusi soovitus parema järgimise eesmärgil põhjendatuiks.

Ilmar Kaur, Põhja-Eesti Regionaalhaigla üldkirurg-ülemarst, Kaalukirurgia Keskuse ülemarst