

Taotlus nr 1293 „Kaugelearenenud või retsiveerunud lokaalselt levinud lamerakulise pea ja kaela piirkonna vähi ravi PD-1 antikeha nivolumabiga“

Meditsiinilise tõendus põhise hinnang

LISAANDMED

1. Missugune on hetkel teenuse 315R („Pea- ja kaelapiirkonna kasvaja kemoterapiakuur“) raames paklitakseeli monoravi saavate patsientide hinnanguline koguarv aastas?

Vastus: hinnanguliselt II valiku ravi paklitakseeli või selle analoogi docetaxeliga (teatud juhtudel ka metotreksaadiga) saavad ~ 15 % keemiaravi saavatest haigetest. 2016 andmetel kokku 130-st haiget saanud keemiaravi s. o ~20 haiget vajaks II rea ravi aastas.

2. Kui suur osa (%) patsientidest, kes saab hetkel teenuse 315R raames monoravi paklitakseeliga, saab seda tsisplatiin-sobimatuse tõttu ja kui suur osa (%) teises ravireas?

Vastus: hinnanguliselt tsisplatiini sobimatuse tõttu monoravi taksaaniga on kasutusel valdaval vähemusel ehk ~ 5% juhtudest, 95% on tegemist teise rea raviga.