

Taotlus 1417. Meditsiinilise eksperdi vastus lisaküsimusele

Küsimus: Täpsustaksime kaugele arenenud TNBC 1. rea standardravi. Taotluses on märgitud, et selleks on keemiaravi (teenus 228R), kuid palun selgitada, millist konkreetset raviskeemi tavapäraselt kasutatakse. Nii UK (NICE) kui Rootsi (TLV) on kohase alternatiivina käsitletud näiteks paklitakseeli monoravi.

Vastus: Erinevates ravijuhistes (k.a nii ESMO kui ka NCCN) on välja toodud, et 1.rea standardravis soovitatakse kas taksaani või antratsükliini ning kas monoteraapiana või kombinatsioonravi. Raviarstil täpse raviskeemi valik sõltub nii patsiendist, tema üldseisundist, kaasuvatest haigustest ning põhihaiguse näitajatest.

Näiteks võimalikud raviskeemid: sol.Doxorubicin 60-75mg/m² i/v q3; sol.Epirubicin 60-90mg/m² i/v q3; sol.Paclitaxeli 175mg/m² i/v q3; sol.Paclitaxeli 80mg/m² i/v q1; sol.Docetaxel 60-100mg/m² i/v q3; sol.Epirubicin 75mg/m² i/v + sol.Cyclophosphamide 600mg/m² i/v q3; sol.Doxorubicin 60mg/m² i/v +sol.Cyclophosphamide 600mg/m² i/v q3.