

## 2018. aasta eriarstiabi hinnatud nõudluses kasutatud võrdlus Maailmapanga analüüsiga

### Eriarstiabis välditavad visiidid

#### 2.tüüpi diabeet

Maailmapanga (MP) analüüsi kohaselt on ca 30% endokrinoloogia ambulatoorsetest ravijuhtudest Eestis seotud 2.tüüpi diabeediga (E11), nendest omakorda ca 20% eriarstiabis põhjendamatud. Diabeedihaigete jälgimine peaks MP soovitusel liikuma rohkem esmatasandile.

Tabel 1. Kasutuse näitajad eriarstiabis 2.tüüpi diabeedi ravijuhtudest 2016.

näitaja	isikuid	RJ	Ambulatoorsete vastuvõttud	Summa 100% FFS	Ambulatoorsete vastuvõttude summa 100% FFS	Ambulatoorsete vastuvõttude summa osakaal (%)
<b>E11 eriarstiabis</b>	<b>15 561</b>	<b>40 487</b>	<b>51 911</b>	<b>1 647 645</b>	<b>702 660</b>	<b>42,6</b>
sh endokrinoloogias	78%	72%	74%	63%	74%	
sh sisehaigustes	11%	7%	7%	7%	6%	
<b>E11 osakaal endokrinoloogias eriala mahust</b>	<b>28%</b>	<b>31%</b>	<b>28%</b>	<b>18%</b>	<b>27%</b>	
<b>E11 osakaal sisehaigustes eriala mahust</b>	<b>2%</b>	<b>3%</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>	
<b>Kokku välditav maht 20%</b>		<b>-6 380</b>	<b>-8 421</b>	<b>-227 729</b>	<b>-112 887</b>	
Endokrinoloogia		-5 790	-7 701	-206 176	-104 103	
Sisehaigused		-590	-720	-21 553	-8 784	

\*FFS-teenusepõhine hind

Välditava teenuse maht on arvestatud 20% E11 põhidiagnoosiga juhtudest kahel peamisel erialal. Arvestatud on visiitidega vältimisega. Teiste erialade mahust välditavust ei ole arvestatud (21% juhtude korral 30% summast).

#### Hüpertooniatõbi

Ligikaudu pooled ambulatoorsetest kardioloogia ravijuhtudest on seotud MP analüüsi kohaselt kõrgvererõhu tõvega (I10-I15) ja nendest ca 70% oleksid eriarsti tasemel välditavad ehk esmatasandil käsitletavad.

Tabel 2. Kasutuse näitajad eriarstiabis kõrgvererõhu tõvega ravijuhtudest 2016.

näitaja	isikuid	RJ	Ambulatoorsed vastuvõttud	Summa 100% FFS	Ambulatoorsete vastuvõttude summa 100% FFS	Ambulatoorsete vastuvõttude summa osakaal (%)
<b>I10-I15 eriarstiabis</b>	<b>35 501</b>	<b>54 124</b>	<b>77 335</b>	<b>4 502 567</b>	<b>1 279 248</b>	<b>28,4</b>
sh kardioloogias	79%	76%	74%	76%	76%	
sh sisehaigustes	14%	11%	13%	12%	12%	
<b>I10-I15 osakaal kardioloogias eriala mahust</b>	<b>49%</b>	<b>45%</b>	<b>45%</b>	<b>44%</b>	<b>43%</b>	
<b>I10-I15 osakaal sisehaigustes eriala mahust</b>	<b>7%</b>	<b>6%</b>	<b>6%</b>	<b>7%</b>	<b>6%</b>	
<b>Kokku välditav maht 70%</b>		<b>-33 165</b>	<b>-47 070</b>	<b>-2 773 598</b>	<b>-784 953</b>	
Kardioloogia		-28 935	-40 297	-2 407 822	-681 191	
Sisehaigused		-4 230	-6 773	-365 776	-103 762	

Välditava teenuse maht on arvestatud 70% I10-I15 põhidiagnoosiga juhtudest kahel peamisel erialal. Arvestatud on visiitidega vältimisega. Teiste erialade mahust välditavust ei ole arvestatud (13% juhtude korral 12% summast).

**Kokku 2.tüüpi diabeedi ja hüpertooniatõve haigusega välditavate visiitidega kaasnev mahu vähenemine (nõudluse vähenemine)**

-55 491 ambulatoorset vastuvõttu ehk -39 545 ravijuhtu summas - 897 840 € 2017. aasta aprilli hinnas.